

01. 馬纓丹

- 學名：*Lantana camara*
- 科名：馬鞭草科
- 別名：五色梅、臭草
- 特性：

1645 年間由荷蘭人引進台灣，雖然為外來種，但已經馴化很長時間，生命力強大，耐乾旱、耐貧瘠、耐高溫乾熱，栽培容易。花色繁多，終年開花，觀花性極強，植物體含特殊氣味，花蜜豐富，作為蝴蝶重要的蜜源植物，適合庭園種植、花盆美化，亦可作綠籬，常見於本市分隔島、園道及人行道種植。



02. 小花紫薇

- 學名：*Lagerstroemia indica* Linn.
- 科名：千屈菜科
- 別名：百日紅、滿堂紅、癢癢花
- 特性：

台灣最早於1700年從中國引入，喜歡溫暖多濕的環境，耐高溫烈日，喜全日照直射陽光。極富四季變化，春天綠意盎然，夏天花朵盛開，秋天葉片轉為紅黃色，冬天只剩枯桿枝條，春夏秋冬各具有不同的樣貌。根系較不易破壞硬鋪面，且較耐空氣汙染，可作綠籬亦可作行道樹。



03. 朱槿

- 學名：*Hibiscus rosa-sinensis L.*
- 科名：錦葵科
- 別名：扶桑、赤槿、佛槿、桑槿、大紅花
- 特性：

台灣最早於明鄭時期從中國引入，生命力強且耐旱，繁殖容易，插枝即活，屬於陽性植物，日照充足，生長及開花即佳，花四季常開，花數多、花朵大，花色多為暖色調，洋溢熱帶氛圍，花朵會吸引昆蟲吸食，常見的蜜源植物，耐修剪，適合作為綠籬美化市容。



04. 仙丹

- 學名：*Ixora spp.*
- 科名：茜草科
- 品種：宮粉仙丹、矮仙丹、洋紅仙丹、大王仙丹
- 特性：

仙丹為常綠灌木，耐高溫，高濕環境生長佳，生長旺季多澆水、施肥，開花不間斷，全年均能開花，以夏、秋兩季更為盛開，花瓣聚生成團，成團如繡球，花期長，花色艷麗，觀花性極強，常作為綠籬。目前國泰路、南京路、凱旋路矮仙丹盛花期時，如同紅色廊道，夾道歡迎過路人。



05. 金露花

- 學名：*Duranta repens* Linn.
- 科名：馬鞭草科
- 別名：如意草、連翹
- 原產地：南美洲
- 特性：

於全台灣都可見到其蹤影，性喜高溫多濕，生長極快速，生長力旺盛，分枝能力強且耐修剪，春至秋季開花，花色為藍紫色，善於招蜂引蝶，是重要蝴蝶蜜源植物。具有金黃色如串珠狀的果實，因而得名，常作為綠籬使用，常見於本市分隔島、園道及人行道種植。



06. 長紅木

- 學名：*Decaspermum fruticosum* J.R. & G.Forst
- 科名：桃金娘科
- 別名：紅楠木
- 原產地：中國、菲律賓、澳洲、印度、馬來西亞、泰國、越南、緬甸
- 特性：

常綠灌木或小喬木，之條紅色；葉互生，狹橢圓形，長 2.5 至 8 公分，寬 1.5 至 3 公分，革質，幼芽鮮紅；花穗腋生，可達 7.5 公分，花白或淡綠色；漿果球型，徑 0.6 公分，種子 3 或 4 枚。植株耐修剪，宜作綠籬、塑形等庭園佈置。



07. 春不老

- 學名：*Ardisia solanacea* Roxb.
- 科名：紫金牛科
- 別名：酸苔菜、蘭嶼紫金牛
- 原產地：台灣蘭嶼與綠島、印度、中國大陸、東南亞
- 特性：

常綠灌木，株高可達6公尺以上，小枝粗，無毛；葉互生，肉質，橢圓狀披針形或倒披針形，長6至12公分，寬4至7公分，先端尖銳或近圓，基部楔形，葉柄長1至2公分；繖形花絮，近頂生或腋生，總梗長5至10公分，花梗長1至3公分，均無毛，花瓣粉紅色，寬卵形長約0.9公分，密被腺點；漿果狀核果扁球形，徑1.2公分，紫紅色或帶黑色，是誘鳥植物。



08. 斑葉月桃

- 學名：*Alpinia zerumbet* (Pers.) B.L. Burtt & R. M. Smith ‘Variegata’.
- 科名：薑荷科
- 別名：花葉豔山薑
- 原產地：園藝栽培種
- 特性：

斑葉月桃為月桃的園藝栽培種，多年生草本，叢生、株形比月桃矮小，高2至3公尺，根莖橫生；葉革質矩圓狀，披針形，長60公分、寬12公分，有短柄，邊緣有短柔毛，葉片有黃色條紋，主要以觀葉為主；花期6至7月，開花具有特殊的芳香味，圓錐花序似總狀花序，下垂，苞片白色，頂端及基部粉紅色，花萼近鐘形，花冠白色；果實紅色。因月桃葉子具芳香，可作蒸製年糕及粿的鋪墊或包粽子的材料。



09. 月橘

- 學名：*Murraya exotica* L.
- 科名：芸香科
- 別名：七里香
- 原產地：台灣、中國大陸、琉球、印度、馬來西亞、菲律賓
- 特性：

常綠灌木，分枝多，花朵極芳香，小枝圓柱形；奇數羽狀複葉，葉軸不具翅，小葉3至9枚，互生，卵形、倒卵形至近菱形，長2.8公分，寬1至3公分，全緣；聚繖花序腋生，同時有頂生，花大而多，花瓣5枚；漿果朱紅色，紡錘形或橢形。



10. 樹蘭

- 學名：*Aglaia duperreana* Pierre

- 科名：棟科

- 別名：四季米仔蘭

- 原產地：越南、泰國

- 特性：


常綠小喬木，多分枝，花朵芬芳；奇數羽狀複葉，葉3至5枚，葉面亮綠；圓錐花序腋生，黃色小花緊密，四季皆能開花，尤以下邱為盛；4月果熟。



11. 茉莉

- 學名：*Jaminum sanbac* (L.) Ait
- 科名：株屬、未利
- 別名：木樨科
- 原產地：印度、中國西部
- 特性：

蔓藤類常綠灌木，芬芳花朵可薰茶，作成茉莉香片；葉對生或輪生，革質，闊卵圓形，長8公分，葉片光滑；花期6至10月，花冠白色，花謝時變粉紅色；開花後通常不結果實。



12. 黃梔

- 學名：*Gardenia angusta* (L.) Merr.
- 科名：茜草科
- 別名：梔子、花黃枝、山梔、山黃梔(枝)
- 原產地：台灣、中國大陸、日本、琉球、中南半島
- 特性：

常綠灌木或小喬木，花朵芬芳；葉對生，卵形、橢圓形或常橢圓狀披針形，長5至10公分，先端銳至短漸尖；花白色，花冠列片長約2.5公分，花瓣有單瓣及重瓣之分；漿果，卵狀至橢圓狀，長2至4公分，有5至9條翅狀直棱，果實是天然染料，可染成黃色。果實稍具毒性，勿食。



13. 桂花

- 學名：*Osmanthus fragrans* (thumb ex A. Murr.) Lour.
- 科名：木犀科
- 別名：木樨、銀桂、巖桂
- 原產地：中國大陸
- 特性：

常綠灌木或小喬木，花朵香氣優雅；葉對生，革質，橢圓狀披針形，長5至10公分，全緣或有細鋸齒，被有細脈，先端尖或漸尖；花丹頂叢生或簇生，白色，花萼具4長足，花冠分裂幾達於基部，裂片長橢圓形；核果長約1公分，幼果綠色，成熟時轉為紫黑色。



14. 炮仗花

- 學名：*Pyrostegia venusta* (Ker) Miers

- 科名：紫葳科

- 別名：黃金珊瑚、金獅花

- 原產地：巴西、玻利維亞、阿根廷、巴拉圭

- 特性：



常綠攀緣大藤本，可攀緣高達 7 至 8 公尺；葉對生，小葉 2 至 3 枚，卵狀長橢圓形，長 5 至 7.5 公分，先端漸尖，有線狀，3 裂的卷鬚；圓錐花序頂生，每年春節前後的 2 至 3 月間，是炮仗花的花期，花冠澄紅色，漏斗狀，長約 6 公分，口部膨大，裂片 5 反捲，邊緣有白毛，萼鐘形，有腺點，花纍纍成串，如串連的鞭炮而得名；蒴果長達 30 公分，開裂線形。



01. 棟樹

- 學名：*Melia azedarach Linn*
- 科名：棟科
- 別名：苦棟
- 原產地：台灣、中國、印度、緬甸
- 高雄市種植地點：
 - 小港區：博學路(山明路至沿海路)、援中路
 - 前鎮區：中山路(凱旋路至五甲路)、勞工公園
- 特性：

台灣本土樹種，生長迅速，陽性樹種宜栽於日照充足之處，性喜高溫，春夏天開藍紫色花，紫色花海顯得浪漫，秋冬果實，成熟金黃色果實在樹上搖曳，由於其果實苦，被稱之為「苦棟」，但靠著它強大的生命力，以堅忍不拔的精神，於路邊、石礫等貧瘠地方都可以生長，台灣處處皆可發現它的蹤跡，活出他的生命價值。



02. 水黃皮

- 學名：*Pongamia pinnata*(L.)Pierre ex Merr

- 科名：蝶形花科

- 別名：九重吹、掛前樹

- 原產地：台灣

- 高雄市種植地點：

- 楠梓區：德民路(啟昌街至高楠公路)

- 左營區：自由路(河堤路至華夏路)

- 旗津區：旗津三路、二路(廟前路至敦和街)

- 特性：

台灣原生種，環境適應力強，植株抗風耐鹽性強，樹性強健，萌芽力頗強，開著淡紫色的花，由於是深根性，根深入土中，能抵抗強風，因此又被稱為「九重吹」，適合做為海岸防風林，是很好的景觀行道樹與防風樹種，常見於本市沿海區域公園綠地。



03. 雨豆樹

- 學名：*Albizia saman* (Jacq.) F.Muell.
- 科名：含羞草科
- 原產地：熱帶美洲
- 高雄市種植地點：
 - 三民區：大順路(自由路至九如路)
 - 小港區：中山四路(平和東路至飛機路)
 - 苓雅區：中正路(高速公路至建軍路)
- 特性：

台灣於 1903 年從南洋引入，於高雄適應性佳，擁有寬廣的樹冠層，茂密的枝條形成良好的遮蔭，成為都市中的綠色隧道。花為粉紅色粉撲狀，葉片於夜晚會下垂閉合，清晨重新展開，葉片間積存的水，隨著葉片的展開而灑落，就像下雨般，又名雨樹。大順路成排的雨豆樹樹齡已達 20 年，常作為行道樹。



04. 風鈴木

- 學名：*Tabebuia impetiginosa* (Mart. ex DC.) Standl.、
Tabebuia chrysanthra (Jacq.) G. Nicholson
- 科名：紫葳科
- 品種：紅花風鈴木、洋紅風鈴木、黃花風鈴木
- 高雄市種植地點：
 - 苓雅區：中正路(河東路至建軍路)
 - 前鎮區：和平二路(廣西路至一心路)
 - 左營區：博愛路(文自路至華夏路)
 - 新興區：七賢路
- 特性：

台灣於 1967 年引進栽植，性喜高溫，日照充足地區，中、南部適合栽植，其花期約每年 12 月至翌年 3 月，有洋紅、紅花及黃花等花色，觀花性很高，花盛開懸掛於枝梢，花冠如風鈴因此得名，可作為庭園樹及行道樹。



05. 檉木

- 學名：*Zelkova serrata* (Thunb.) Makino
- 科名：榆科
- 別名：紅雞油、雞油、紅檉木
- 高雄市種植地點：
 - 灰雅區：四維三路、民生路
- 特性：

台灣原生樹種，落葉大喬木，樹性強健，壽命長，一旦生長穩定，對於風和乾旱的忍受度強。樹冠大、枝葉濃密，可提供良好遮蔭，冬天葉片轉為黃褐色，具有觀賞價值。樹幹刨光後會有油蠟感，彷彿在上面塗過雞油，木材顏色為赭紅色，因此有了別名，可作為園藝用樹，亦是上等木材。



06. 光臘樹

- 學名：*Fraxinus formosana* Hayata
- 科名：木犀科
- 別名：台灣白臘樹、白雞油、山苦棟
- 高雄市種植地點：
 - 小港區：高鳳路(過埠路至高松路)
 - 左營區：新庄仔路(博愛路至河堤路)
- 特性：

為台灣原生樹種，對氣候適應性大，生長快速，直向上發展，於4月至6月，會吸引獨角仙吸食光臘樹樹液，富有生態教育意義。其樹皮會有雲形剝落狀為其特色，而樹皮擠出的油像雞油，因而得其別名，可作為造林樹種、庭園樹種。



07. 大葉桃花心木

- 學名：*Swietenia macrophylla* King

- 科名：楝科

- 原產地：墨西哥、中美洲

- 高雄市種植地點：

- 三民區：同盟路
- 前鎮區：中華五路
- 凤山區：建國路

- 特性：


原產中美洲的大葉桃花心木性喜陽光高溫，樹幹挺拔樹形優美，冬天至早春有半落葉現象，成長後枝葉茂密，遮蔭效果好，是優良的庭園樹、行道樹。在 20 世紀初引進台灣，其木材是製家具、器具、建材及雕刻的材料。碩大的卵形果實，成熟後會木質化，其中紅褐色的翅果會像竹蜻蜓般飄落，可當童玩。



08. 茄苳

- 學名：*Bischofia javanica* Blume
- 科名：大戟科
- 別名：重陽路、秋楓樹
- 原產地：台灣、中國大陸、琉球、東南亞與太平洋諸島
- 高雄市種植地點：
 - 三民區：澄清路
 - 前金區：中華四路
- 特性：

茄苳樹喜生長於低海拔濕度高區域，樹冠呈扇形至闊卵形，面積寬大，樹幹多粗壯，不但耐颱風侵襲、抗污染力強、枝葉繁盛是很好的庭園樹與行道樹。它的樹幹粗糙，生長快速，樹皮褐色肥厚多汁，木質硬度中等，可以做桶、臼等器具，有時也會拿來作建築木材。由於生命力強，壽命長，所以被選為重陽樹。



09. 黃連木

- 學名：*Pistacia chinensis* Bunge

- 科名：漆樹科

- 別名：楷樹、爛心木

- 高雄市種植地點：

- 新興區、苓雅區：中山一二路
- 左營區：博愛二路、華夏路
- 左營區、三民區：民族一路、博愛一二路
- 新興、前金、鹽埕區：五福路

- 特性：


黃連木的樹心很容易腐爛中空，因此又稱為「爛心木」，然而它仍是優良木材，質堅緻密，且色澤花紋亮麗，在商用木材的分類中，黃連木屬於台灣產闊葉材的一級木。嫩葉是紅色的，在春、秋兩季都非常美麗。黃連木之幼葉有香味可製茶葉，又名黃鸝茶或黃皂茶。



10. 印度紫檀

- 學名：*Pterocarpus indicus* Willd.
- 科名：蝶形花科
- 別名：紫檀
- 原產地：熱帶亞洲
- 高雄市種植地點：
 - 鼓山、三民區：中華一二路
 - 苓雅區：青年路、澄清路
- 特性：

樹形優美的印度紫檀是四季分明的行道樹，秋冬落葉，春天冒出嫩葉，夏天濃密的樹冠是很好的遮蔭。花期時，開花與落花更是將樹頭與地面染得一片鵝黃，既然花為黃色，為何叫紫檀呢？原來頗開樹幹後會流出紫紅汁液而名之。



11. 台灣欒樹

- 學名：*Koelreuteria elegans*
- 科名：無患子科
- 別名：苦苓舅
- 原產地：台灣
- 高雄市種植地點：
 - 苓雅區、前鎮區：民權路
 - 新興區、前金區：民生路
 - 凤山區：建國路
 - 楠梓區：興楠路
- 特性：

台灣欒樹是台灣特有原生樹種，抗污染性高，是城市中極受歡迎的行道樹種，不開花時羽狀複葉與棟樹十分相似，因而又被稱為苦苓舅、苦苓公。在入秋後，枝頭綻放出黃色小花，花期甚短大約只有兩週，接著結起紅褐色蒴果，霎時間整條街道被染成一片嫩紅色，堪稱是最有秋味的城市風景。而每到春夏台灣欒樹總吸引赤腰燕盤旋，原來是紅姬緣椿象喜食欒樹樹枝幹與種子汁液，而赤腰燕趕來吃群集的椿象大餐。



12. 凤凰木

- 學名：*Delonix regia* (Bojer) Raf.

- 科名：蘇木科

- 原產地：馬達加斯加

- 高雄市種植地點：

➤ 三民區、鼓山區：中華一二路

- 特性：

鳳凰木據傳是因此樹引入中國時，最早在澳門鳳凰山種植而得名。台灣是在日治時代由日人引進，由於鳳凰木盛開的時節，正值盛夏、驪歌高唱的六月畢業季，於是蟬鳴不斷的鳳凰花開季節，就是台灣學子最難忘的回憶。



13. 白千層

- 學名：*Melaleuca quinquenervia* (Cav.) S.T. Blake

- 科名：桃金娘科

- 別名：百千層

- 原產地：澳洲

- 高雄市種植地點：

- 前金區、苓雅區：中華四路

- 楠梓區：後昌路、區東路

- 三民區：自由路

- 特性：

白千層最大的特點是多層樹皮，每年白千層都會長出新皮，並將老皮往外推擠，但老樹皮仍會一層一層的留在樹幹上，像是千層派一樣，撕下一片樹皮在手上搓揉，會有淡淡的清香味。花朵外觀則像是支模樣可愛的奶瓶刷。白千層樹皮厚而疏鬆，堆疊的老樹皮，撕下後可拿來寫字、當橡皮擦，當作孩童的玩具；農委會林業試驗所化學系還曾將葉片萃取類似綠油精的芳香油，是日常衛生和化工醫療用品的原料。



14. 美人樹

- 學名：*Chorisia speciosa* A. St. Hil

- 科名：木棉科

- 別名：巴西木棉、南美木棉

- 原產地：巴西、阿根廷

- 高雄市種植地點：

- 楠梓區：後勁溪兩側

- 苓雅區：四維路

- 三民區：愛河之心

- 特性：

美人樹在 1967 年引進台灣，由於同屬木棉科，在不開花時神似高雄人熟悉的木棉樹，木棉樹別名英雄樹，而美人樹開花綻放滿樹嬌豔粉紅，因而稱為美人樹。仔細觀察，木棉樹皮呈灰褐色，美人樹則為綠色；小葉葉緣有細鋸齒狀，也與木棉的全緣葉緣不同。

